

Cochinillas (cócidos)

- Tipos:
 - Diaspinos: Cochinillas con caparazón o escudo protector (piojos y serpetas)
 - Lecaninos: Cochinillas con un tegumento endurecido (caparretas)
 - Cochinillas con una protección cérea algodonosa

Cochinillas diaspinas: Piojos

- Piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus*). Redondo, de color negro o muy oscuro. Parásito: Himenóptero *Prospaltella perniciosi*
- Piojo gris (*Parlatoria pergandei*). Similar al anterior, más grisáceo. Parásito: *Aphis hispanicus*
- Piojo rojo (*Chrysomphalus dyctiospermi*). Parásito: *Aphis melinus*
- Piojo negro (*Parlatoria zizyphi*)
- Piojo blanco (*Aspidiotus nerii*)

Cochinillas diaspinas: serpetas

- Serpeta fina (*Lepidosaphes gloveri*).
Forma de coma alargada, bien definida.
Parásito: Himenóptero *Encarsia elongata*
- Serpeta gruesa (*Lepidosaphes bechii*).
Más gruesa que la anterior. A veces la forma de coma puede estar menos definida. Parásito: *Aphitis lepidosaphes*

Cochinillas lecaninas

- Caparreta negra, cochinilla de la tizne o del olivo (*Saissetia oleae*). Parásito: *Metaphicus* sp
- Caparreta blanca (*Ceroplastes sinensis*)
- Cochinilla de los agrios (*Coccus hesperidum*)

Cochinillas algodonosas

- *Cochinilla acanalada* (*Icerya purchasi*). Tiene acanaladuras longitudinales. Depredador (muy efectivo): Escarabajo *Rodolia* o *Novius cardinalis*
- *Cotonet* o algodón (*Planococcus* o *Pseudococcus citri*). Depredador (muy efectivo): Escarabajo *Cryptolaemus montruzieri*. Parásito: Avispa *Leptomastix datilopii*

Cochinillas diaspinas: piojos



Piojo de San José



Prospaltella perniciosi



Piojo rojo



Aphitis melinus

Serpetas y caparretas



Serpeta fina



Encarsia formosa



Cochinilla olivo



Metaphicus sp

Cochinillas algodonosas



Cochinilla acanalada




Rodolia cardinalis



Cotonet



Leptomastix



Cryptolaemus larva y adulto

